



Der Basiswechsel wird angewandt, um Logarithmen zu beliebigen Basen numerisch auszurechnen. Es stellt sich heraus, dass der natürliche Logarithmus zur Basis  $e \approx 2.7182818$  am einfachsten zu berechnen ist. Daher werden alle Logarithmen von Computern wie folgt berechnet:

$$\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$$

**Merke 18.8** Logarithmusgesetze

$$\log_b(x \cdot y) = \log_b(x) + \log_b(y) \qquad \log_b(x^y) = y \cdot \log_b(x)$$

Daraus folgt

$$\log_b\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_b(x) \qquad \log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y) \qquad \log_b(x) = \frac{\log_c(x)}{\log_c(b)}$$

Vor der Ära der Taschenrechner waren Rechenschieber weit verbreitet. Die Grundform sind zwei **logarithmische Skalen**, d.h. die Zahl  $x$  hat den Abstand proportional zu  $\log(x)$  von der Zahl 1 (was als Nullpunkt der logarithmischen Skala aufgefasst werden kann). Damit kann nun multipliziert werden, indem mit zwei gleichen Skalen die Abstände addiert werden:

$$\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$$

Bei «modernen» Rechenschiebern sind zusätzlich noch viele weitere Skalen vorhanden, die viele weitere Berechnungen erlauben, wie z.B. Quadrieren oder trigonometrische Funktionen.

**\* Aufgabe 18.24** Rechenschieber: Wer hat's erfunden?

**\* Aufgabe 18.25** Was ist der Zusammenhang zwischen  $\log_x(y)$  und  $\log_y(x)$ ?  
*Hinweis: Zwei mögliche Ansätze: Basiswechsel oder Definition des Logarithmus und Gleichung umformen.*

**\* Aufgabe 18.26** Zerlegen Sie:

- a)  $\log\left(\frac{ab}{a+b}\right)$
- b)  $\log\left(\frac{\sqrt[4]{x}}{x^2-y^2}\right)$
- c)  $\log_a\left(\frac{a \cdot b^c}{\sqrt[3]{a}}\right)$
- d)  $\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\right) + \dots + \ln\left(\frac{999}{1000}\right)$

**\* Aufgabe 18.27** Fassen Sie als einen einzigen Logarithmus zusammen.

- a)  $\log(b) - \log(c + d)$
- b)  $2 \log(x) + 3 \log(y) - 5 \log(z)$
- c)  $\frac{1}{3}(\log(b) + 2 \log(c)) - \frac{1}{2}(5 \log(d) + \log(f))$
- d)  $\ln(a + b) + 1$